

INFORMACIÓN PARA PROFESIONALES DE LA SALUD

SUBDIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS
GRUPO DE FARMACOVIGILANCIA

Inhibidores de la Bomba de Protones (IBP)

De acuerdo con la comunicación de la FDA y los estudios revisados por esta agencia, existe una asociación entre el uso de inhibidores de la bomba de protones (IBP) y la infección o enfermedad por *Clostridium difficile* incluyendo diarrea asociada a *Clostridium difficile* (DACD).

Según lo anterior sugerimos:

- Debe considerarse como diagnóstico diferencial DACD en pacientes con tratamientos de IBP que presentan diarrea persistente.
- Se sugiere aconsejar al paciente consultar al médico tratante si experimenta diarrea sin mejoría, dolor abdominal y fiebre durante el tratamiento con IBP.
- Se sugiere ajustar el esquema terapéutico a la menor dosis y por el tiempo más corto posible según las condiciones del paciente.
- Se sugiere a los profesionales de la salud reportar los eventos adversos relacionados con IBP al programa de Farmacovigilancia del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA).

Fuente: FDA anuncio de seguridad 02/08/2012.