



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

INFORMACION PARA PROFESIONALES DE LA SALUD

DIRECCION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS
GRUPO DE PROGRAMAS ESPECIALES - FARMACOVIGILANCIA

Ceftriaxona

Una vez analizados informes allegados al grupo de farmacovigilancia del INVIMA y evaluada nuestra base de datos de reacciones adversas a medicamentos en conjunto con la literatura disponible en relación con el uso de ceftriaxona y la aparición de pseudocolicitiasis en niños especialmente en el intervalo de edad comprendido entre los 4 días a 14 años. Sugerimos a los profesionales de la salud las siguientes recomendaciones:

- Tener en cuenta factores de riesgo para el desarrollo de pseudocolicitiasis como:
 - Tratamientos prolongados (más de 5 días).
 - Altas dosis en menores de 12 meses (dosis iguales o superiores a 100 mg/kg/día).
 - Ayuno prolongado.
 - Cualquier condición que produzca vaciamiento lento de la vesícula biliar.
 - Deterioro de la función renal.
 - Pacientes con hipercalcemia.
 - Tiempo de infusión del fármaco pues cuando se infunde en 30 minutos o más disminuye la incidencia de aparición del cuadro clínico.
- Este cuadro suele ser asintomático y de resolución espontánea sin embargo es importante realizar seguimiento de los pacientes que la presentan con el objetivo de evitar complicaciones.
- Tener en cuenta este escenario clínico y reportar los eventos adversos asociados a ceftriaxona al Programa Nacional de Farmacovigilancia del INVIMA al correo invimafv@invima.gov.co utilizando el formato de reporte FORAM que se puede descargar de:
http://www.invima.gov.co/images/pdf/farmacovigilancia_alertas/reporte-reacciones/FORAM_WORD_1.doc

Fuente:

- Sivosicos INVIMA 2002 – 2013 consultado el 06/05/13
- http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/ND_T/evidencexpert/ND_PR/evidencexpert/CS/B892AA/ND_AppProduct/evidencexpert/DUPLICATIONSHIELDSYNC/7650D1/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/PFActionId/evidencexpert.IntermediateToDocumentLink?docId=1700&contentSetId=31&title=CEFTRIAZONE&servicesTitle=CEFTRIAZONE#3.3.4.A.2 consultado el 06/05/13
- Rodríguez D, M Bustacara, A Pinilla, L Henao. Coledocolitis y colangitis como complicación del uso de ceftriaxona en niños: reporte de caso, Rev infectio. 2012; 16(3):187-190.

