



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

INFORMACION PARA PROFESIONALES DE LA SALUD

DIRECCION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS
GRUPO DE PROGRAMAS ESPECIALES - FARMACOVIGILANCIA

FLUOROQUINOLONAS

De acuerdo con el comunicado de la FDA, mediante el cual advierte acerca del riesgo de desarrollar neuropatía periférica, que incluso, puede llevar a daño neurológico permanente con el uso de antibióticos de tipo fluoroquinolonas de uso oral e inyectable como: Ofloxacin, Ciprofloxacin, Norfloxacin, Lomefloxacin, Levofloxacin o Moxifloxacin, se presentan a continuación las siguientes recomendaciones:

- Asegúrese de que los pacientes identifiquen cualquier síntoma relacionado con neuropatía periférica, con el fin de que se comunique con su médico.
- Si el paciente presenta síntomas de neuropatía periférica, se debe dejar de administrar el antibiótico y usar uno alternativo que no tenga como principio activo fluoroquinolonas, a menos que el beneficio de continuar con el tratamiento sobrepase el riesgo.
- Reportar los eventos adversos asociados a antibióticos de tipo fluoroquinolonas al Programa Nacional de Farmacovigilancia del INVIMA al correo invimafv@invima.gov.co utilizando el formato de reporte FORAM que se puede descargar de:
http://www.invima.gov.co/images/pdf/farmacovigilancia_alertas/reporte-reacciones/FORAM_WORD_1.doc

Fuente: FDA <http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm365965.htm>

