

Información para profesionales de la salud pacientes y cuidadores

MINSALUD

Invima



DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS GRUPO DE FARMACOVIGILANCIA

Bogotá, 05 de abril de 2017

ANALGÉSICOS TÓPICOS:

Como resultado de la revisión de seguridad realizada por Health Canadá y el análisis del comportamiento de reporte en las bases de datos colombianas, de quemaduras cutáneas asociadas con el uso de analgésicos tópicos de venta libre para el dolor muscular y articular, que contienen mentol, salicilato de metilo o capsaicina, se identificaron casos poco comunes de quemaduras graves que se producen en la piel posterior a su aplicación.

Las quemaduras reportadas, la mayoría de segundo y tercer grado, se describen asociadas al uso de productos que contienen mentol como ingrediente activo único y a productos que contienen mentol junto con salicilato de metilo, en concentraciones superiores al 3% y 10% respectivamente. Se reportaron pocos casos con el uso de productos que contienen solo capsaicina.

Con base en lo anterior, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima recomienda tomar las siguientes medidas, con el fin de minimizar los riesgos asociados al uso de estos productos:

De click en el siguiente enlace para obtener más información:

- ✓ [Medidas para profesionales de la salud](#)
- ✓ [Medidas para pacientes y cuidadores](#)

Dale  a la seguridad
La salud es responsabilidad de todos

MINSALUD

Invima



Información para profesionales de la salud pacientes y cuidadores



MEDIDAS PARA LOS PROFESIONALES DE LA SALUD

- Cuando recomienda un analgésico tópico de venta libre para el dolor muscular y articular a los pacientes, recuérdelos evitar el uso de vendas apretadas, la aplicación de calor local con mantas eléctricas, lámparas, bolsas o botellas de agua caliente en el punto de aplicación, y los riesgos a los cuales puede estar expuesto por la disminución de la sensibilidad en dicha zona.
- Suministre las recomendaciones respectivas en caso de presentar signos de alarma que hagan sospechar la presencia de quemaduras, como dolor, hinchazón o ampollas en la piel. Recomiende la suspensión del producto en caso tal.
- Reporte los eventos asociados al uso de estos productos, al Programa Nacional de Farmacovigilancia del Invima a través de la página web del Invima [aquí](#).

En caso de tener mayor información de seguridad al respecto, el Invima realizará la respectiva actualización al público.

Referencias Bibliográficas consultadas:

1. <http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/reviews-examens/topical-pain-relievers-analgesiques-topiques-eng.php>
2. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK5238/>
3. <http://med.javeriana.edu.co/fisiologia/fw/c371.htm>
4. http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1134-80462004000500007

Dale  a la seguridad
La salud es responsabilidad de todos



Información para profesionales de la salud pacientes y cuidadores



MEDIDAS PARA LA COMUNIDAD EN GENERAL

- Si siente dolor, hinchazón o ampollas en la piel donde se ha aplicado un analgésico tópico de venta libre para el dolor muscular y articular, suspenda el producto y solicite atención médica. Estos productos producen calor o frío localizado, pero no deben causar dolor o daño a la piel.
- Cuando se aplique un analgésico tópico de venta libre para el dolor muscular y articular en la piel, no coloque vendas apretadas ni aplique sobre la zona calor local con mantas eléctricas, lámparas, bolsas o botellas de agua caliente por largos periodos, porque eso puede aumentar el riesgo de quemaduras graves. En caso de que estas actividades hagan parte de un proceso de rehabilitación, permanezca pendiente ante cualquier cambio en la coloración de la piel, recuerde que estos analgésicos disminuyen la sensibilidad temporalmente.
- No aplique analgésicos tópicos de venta libre para el dolor muscular y articular en heridas o piel golpeada, quebrada o irritada. Tampoco deje que entre en contacto con los ojos y las mucosas.
- Si tiene cualquier pregunta o inquietud sobre los analgésicos tópicos de venta libre para el dolor muscular y articular, consulte con un profesional de la salud.
- Es importante reportar estos eventos, al Programa Nacional de Farmacovigilancia a través de la página web del Invima en “Servicios de Información al Ciudadano” – “Denuncias, Quejas y Reclamos” – “Quejas y Reclamos” – “Radical Trámite” – “Quejas y Reclamos” o [aquí](#)
- También pueden reportarse inscribiéndose a través de la plataforma de reporte en línea, [aquí](#).

En caso de tener mayor información de seguridad al respecto,
el Invima realizará actualización al público y recuerde
No se automedique, su seguridad es importante.

Referencias Bibliográficas consultadas:

1. <http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/reviews-examens/topical-pain-relievers-analgiques-topiques-eng.php>
2. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK5238/>
3. <http://med.javeriana.edu.co/fisiologia/fw/c371.htm>
4. http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1134-80462004000500007

Dale  a la seguridad
La salud es responsabilidad de todos

