

Información para profesionales de la salud pacientes y cuidadores

MINSALUD

Invima

**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS GRUPO DE FARMACOVIGILANCIA

Bogotá, 05 de abril de 2017

DASATINIB:

Basados en la información allegada al Invima y la publicada por parte de otras agencias regulatorias, entre estas, la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA) y por parte de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) del Ministerio de Salud de Perú, frente al riesgo de reacciones dermatológicas severas, incluyendo el síndrome de Stevens Johnson y eritema multiforme asociado al consumo de dasatinib y posterior al análisis de la información por nuestros expertos de la sala especializada de medicamentos y productos biológicos, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, recomienda a los profesionales de la salud, pacientes y cuidadores:

De click en el siguiente enlace para obtener más información:

- ✓ [Medidas para profesionales de la salud](#)
- ✓ [Medidas para la comunidad en general](#)

Dale  a la seguridad
La salud es responsabilidad de todos

MINSALUD

Invima

**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Información para profesionales de la salud pacientes y cuidadores



MEDIDAS PARA LOS PROFESIONALES DE LA SALUD

- Monitorizar en los pacientes que reciben dasatinib, reacciones dermatológicas severas, especialmente en pacientes expuestos previamente a un agente inhibidor de tirosin kinasa.
- Determinar la necesidad de suspender de manera permanente el tratamiento con dasatinib en los pacientes que experimentan una reacción mucocutánea severa durante el tratamiento.
- Recordar al paciente que se encuentra en manejo con dasatinib, la importancia de mantener una hidratación adecuada.
- Evaluar los niveles de ácido úrico y de electrolitos de los pacientes, antes y durante el tratamiento con dasatinib, para minimizar el riesgo de complicaciones renales.
- En caso de presentarse eventos adversos relacionados con el uso de dasatinib, repórtelos al Programa Nacional de Farmacovigilancia a través de la página web del Invima [aquí](#).

Estaremos al tanto de este problema de seguridad y en caso de tener mayor información al respecto, se realizará la actualización al público.

Referencias Bibliográficas consultadas:

- http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/Alertas/2016/ALERTA_43-16.pdf

Dale  a la seguridad
La salud es responsabilidad de todos

 MINSALUD

 Invima

 **TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Información para profesionales de la salud pacientes y cuidadores



MEDIDAS PARA LA COMUNIDAD EN GENERAL

- Informe a su médico si durante el tratamiento con dasatinib presenta reacciones en la piel asociadas a fiebre.
- Informe a su médico si durante el tratamiento con dasatinib presenta úlceras, ampollas o descamación en la piel, boca o garganta.
- Durante su tratamiento con dasatinib, manténgase adecuadamente hidratado.
- Es importante reportar los eventos asociados al uso de dasatinib, al Programa Nacional de Farmacovigilancia a través de la página web del Invima en “Servicios de Información al Ciudadano” – “Denuncias, Quejas y Reclamos” – “Quejas y Reclamos” – “Radicar Trámite” – “Quejas y Reclamos” o [aquí](#).
- También pueden reportarlos, inscribiéndose a través de la plataforma de reporte en línea, [aquí](#).

En caso de tener mayor información de seguridad al respecto, el Invima realizará la actualización al público y recuerde
No se automedique, su seguridad es importante.

Referencias Bibliográficas consultadas:

1. http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/Alertas/2016/ALERTA_43-16.pdf