

# Información para profesionales de la salud pacientes y cuidadores

MINSALUD

Invima



DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS GRUPO DE FARMACOVIGILANCIA

Bogotá, 08 de mayo de 2017

## ANTIPSICÓTICOS ATÍPICOS

Acorde a la información contenida en nuestras bases de datos y a la revisión de la literatura científica disponible sobre esta clase de medicamentos, el Invima informa a los profesionales de la salud, pacientes y cuidadores que:

Los antipsicóticos atípicos, son considerados fármacos de primera línea en el tratamiento de la esquizofrenia y otras enfermedades psicóticas, por su mayor eficacia y menor incidencia de síntomas extrapiramidales. Sin embargo, su uso está asociado a efectos colaterales de tipo metabólico como hiperglicemia, aumento de peso, dislipidemia, resistencia insulínica, diabetes mellitus o exacerbación de una diabetes mellitus preexistente, aumento del riesgo cardio-cerebrovascular, además se han reportado, aunque en menor cantidad casos de impotencia sexual con el uso de estos medicamentos.

De click en el siguiente enlace para obtener más información:

- ✓ [Medidas para profesionales de la salud](#)
- ✓ [Medidas para la comunidad en general](#)

Dale  a la seguridad  
La salud es responsabilidad de todos

MINSALUD

Invima



# Información para profesionales de la salud pacientes y cuidadores



## MEDIDAS PARA LOS PROFESIONALES DE LA SALUD

- Los pacientes tratados con antipsicóticos atípicos deben ser monitorizados clínicamente, especialmente aquellos con historia personal o familiar de diabetes mellitus tipo 2 y con antecedentes de resistencia a la insulina.
- Como médico tratante, se le recomienda que a sus pacientes con enfermedad mental crónica en tratamiento con antipsicóticos atípicos, se les realice un seguimiento completo de forma regular que incluya, peso, talla, presión arterial, evaluación de masa corporal (IMC), evaluación de glicemia, insulinemia y estudio de lípidos.
- Insista con sus pacientes en medidas nutricionales y ejercicio físico regular con el objetivo de prevenir o tratar la aparición de los eventos adversos mencionados.
- En caso de aparición de hiperglicemia, aumento de peso, dislipidemia, resistencia insulínica, diabetes mellitus o exacerbación de una diabetes mellitus preexistente, o impotencia sexual, realice una evaluación sobre el riesgo/beneficio del uso de estos fármacos en su paciente, con el fin de continuar o suspender la medicación.

En caso de efectos secundarios serios relacionados al uso de este medicamento, reporte al Programa Nacional de Farmacovigilancia a través de la página web del Invima [aquí](#)

También pueden reportarse inscribiéndose a través de la plataforma de reporte en línea, [aquí](#).

En caso de tener mayor información al respecto, se realizará la debida actualización al público.

1. [http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0717-92272004000100005](http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-92272004000100005)

2. Stip, E. (2000). Antipsicóticos nuevos: temas y controversias. Tipicidad de los antipsicóticos atípicos. *Revista de Psiquiatría del Uruguay*. [online] 60(1), pp.71-72. Available at: [http://www.mednet.org.uy/~spu/revista/may2001/05\\_dor.pdf](http://www.mednet.org.uy/~spu/revista/may2001/05_dor.pdf) [Accessed 27 Sep. 2016].

3. Whocc.no. (2016). WHOCC - ATC/DDD Index. [online] Available at: [http://www.whocc.no/atc\\_ddd\\_index/](http://www.whocc.no/atc_ddd_index/) [Accessed 13 Oct. 2016].

4. Sapunar Z, J., Muñoz N, S. and Vásquez A, T. (2009). Comparación del efecto de la terapia prolongada con antipsicóticos atípicos o convencionales en la incidencia de diabetes mellitus 2: Revisión sistemática y metaanálisis. *Revista médica de Chile*, 137(11).

Dale  a la seguridad  
La salud es responsabilidad de todos



# Información para profesionales de la salud pacientes y cuidadores



## MEDIDAS PARA LA COMUNIDAD EN GENERAL

Los antipsicóticos atípicos disponibles en Colombia son risperidona, paliperidona, clozapina, olanzapina, aripiprazol, quetiapina, asenapina, ziprasidona y amisuprida. Son un grupo de medicamentos utilizados en la esquizofrenia, desorden bipolar, entre otras enfermedades mentales, si usted como paciente se encuentra en tratamiento con alguno de estos fármacos, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Informe a su médico si usted o su familia tiene antecedente de diabetes.
- Comunique a su médico, si usted presenta aumento o pérdida de peso, aumento de apetito, sed exagerada, orina abundante o disfunción sexual.
- No suspenda sus medicamentos sin autorización de su médico tratante.
- Es importante reportar estos eventos, al Programa Nacional de Farmacovigilancia a través de la página web del Invima en “Servicios de Información al Ciudadano” – “Denuncias, Quejas y Reclamos” – “Quejas y Reclamos” – “Radicar Trámite” – “Quejas y Reclamos” o [aquí](#).
- También pueden reportarse inscribiéndose a través de la plataforma de reporte en línea, [aquí](#).

En caso de tener mayor información de seguridad al respecto, el Invima realizará la actualización al público y recuerde No se automedique, su seguridad es importante.

### Referencias Bibliográficas consultadas:

1. [http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0717-92272004000100005](http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-92272004000100005)
2. Stip, E. (2000). Antipsicóticos nuevos: temas y controversias. Tipicidad de los antipsicóticos atípicos. *Revista de Psiquiatría del Uruguay*, [online] 60(1), pp.71-72. Available at: [http://www.mednet.org.uy/~spu/revista/may2001/05\\_dor.pdf](http://www.mednet.org.uy/~spu/revista/may2001/05_dor.pdf) [Accessed 27 Sep. 2016].
3. Whocc.no. (2016). WHOCC - ATC/DDD Index. [online] Available at: [http://www.whocc.no/atc\\_ddd\\_index/](http://www.whocc.no/atc_ddd_index/) [Accessed 13 Oct. 2016].
4. Sapunar Z, J., Muñoz N, S. and Vásquez A, T. (2009). Comparación del efecto de la terapia prolongada con antipsicóticos atípicos o convencionales en la incidencia de diabetes mellitus 2: Revisión sistemática y metaanálisis. *Revista médica de Chile*, 137(11).

Dale  a la seguridad  
La salud es responsabilidad de todos

