

# Información para profesionales de la salud pacientes y cuidadores

MINSALUD

Invima



DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS GRUPO DE FARMACOVIGILANCIA

Bogotá, 8 de mayo de 2017

## COBICISTAT Y RITONAVIR:

Con base en el análisis de la información de reportes al Invima y las recomendaciones publicadas por parte de la la agencia de Reino Unido (MHRA), el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, se permite informar que:

Existe riesgo de presentar insuficiencia suprarrenal, supresión adrenal y el síndrome de Cushing, con la coadministración de glucocorticoides con cobicistat así como con ritonavir.

Esta interacción se produce incluso con la administración de corticoides no sistémicos, entre las que se incluyen la administración intranasal, inhalado, y rutas intra-articulares.

Aunque el riesgo de una interacción que conduce a efectos corticosteroides adversos no se elimina completamente, se describe que con el uso concomitante de beclometasona, este riesgo puede ser menor.

Basado en lo anterior y posterior al análisis de la información por nuestros expertos de la sala especializada de medicamentos y productos biológicos, el Invima recomienda a los profesionales de la salud, pacientes y cuidadores:

De click en el siguiente enlace para obtener más información:

- ✓ [Medidas para profesionales de la salud](#)
- ✓ [Medidas para la comunidad en general](#)

Dale  a la seguridad  
La salud es responsabilidad de todos

MINSALUD

Invima



# Información para profesionales de la salud pacientes y cuidadores



## MEDIDAS PARA LOS PROFESIONALES DE LA SALUD

- Evite el uso de corticoides en pacientes que se encuentren en manejo con ritonavir o cobicistat.
- Monitorice reacciones sistémicas relacionadas con los corticosteroides, en caso de ser necesario su uso concomitante con cobicistat o ritonavir.
- En caso de presentarse eventos adversos relacionados, repórtelos al Programa Nacional de Farmacovigilancia a través de la página web del Invima [aquí](#).

Estaremos al tanto de este problema de seguridad y en caso de tener mayor información al respecto, se realizará la actualización al público.

---

### Referencias Bibliográficas consultadas:

1. <https://www.gov.uk/drug-safety-update/cobicistat-ritonavir-and-coadministration-with-a-steroid-risk-of-systemic-corticosteroid-adverse-effects>

Dale  a la seguridad  
La salud es responsabilidad de todos

 MINSALUD

 Invima

 **TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

# Información para profesionales de la salud pacientes y cuidadores



## MEDIDAS PARA LA COMUNIDAD EN GENERAL

- Evite el uso de corticoides si usted se encuentra en manejo con ritonavir o cobicistat.
- Es importante reportar los eventos asociados al uso de estos productos, al Programa Nacional de Farmacovigilancia a través de la página web del Invima en “Servicios de Información al Ciudadano” – “Denuncias, Quejas y Reclamos” – “Quejas y Reclamos” – “Radicar Trámite” – “Quejas y Reclamos” o [aquí](#).
- También pueden reportarlos, inscribiéndose a través de la plataforma de reporte en línea, [aquí](#).

En caso de tener mayor información de seguridad al respecto, el Invima realizará la actualización al público y recuerde  
No se automedique, su seguridad es importante.

---

### Referencias Bibliográficas consultadas:

1. <https://www.gov.uk/drug-safety-update/cobicistat-ritonavir-and-coadmsitration-with-a-steroid-risk-of-systemic-corticosteroid-adverse-effects>

Dale  a la seguridad  
La salud es responsabilidad de todos

 MINSALUD

 Invima

 **TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN